



ફ્રીફ પલ્સ થેરાપી

Psychiatry

Psychology

Neuro-Psychiatry



ઇલેક્ટ્રોકન્વલજીવ થેરાપી જે બ્રીફ પલ્સ થેરાપી તરીકે પણ ઓળખાય છે

ઇલેક્ટ્રોકન્વલજીવ થેરાપી દશકાઓથી વિવિધ મનોચિકિત્સકીય બિમારીઓ માટે પસંદગીકૃત સારવાર રહી છે. સમય જતા, તકનીકી પરિમાણોમાં સુધારણાઓ, નવીનતમ દવાઓના આગમન અને તેમને શરીરમાં દાખલ કરવાની તકનીકોને કારણે, ઇલેક્ટ્રોકન્વલજીવ થેરાપી વધુ સુરક્ષિત, સંભ્ય અને સારવારના અસરકારક સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થઈ છે.

થેરાપીનું નવું સ્વરૂપ, અપેક્ષિત અસર ઉત્પન્ન કરવા માટે એનેર્યેશીયા હેઠળ, ઉતેજના માટે વધુ સાંકડા પલ્સીસનો ઉપયોગ કરે છે. સારવારનું આ સ્વરૂપ બ્રીફ પલ્સ થેરાપી તરીકે જાણીતું છે.

મનોચિકિત્સાની ધારી સ્થિતિઓમાં બ્રીફ પલ્સ થેરાપી સંભાળનું “સુવર્ણ માનક” છે.

લક્ષણોમાં સમાવેશ છે :

- ઉન્માદ
- મૂઢતા તરફ પ્રગતિશીલ ઉન્માદ
- અતિઉન્માદથી અતિઉદાસીનતા વરચે ફરતી મનોદશા
- ઉદાસીનતાનો મુખ્ય વિકાર
- મનોરોગરોધક દવાઓ પ્રત્યે કવચિત પ્રતિક્રિયાનું સંલક્ષણ
- સ્કીઝોફેનીયા અને સંલગ્ન મનોરોગી સ્થિતિઓ
- માનસિક વિકારોને પરિણામે આત્મહંત્યા માટેના વલણો
- માનસિક વિકારોને પરિણામે હિસ્ક / આકમક વર્તણું

અને, પાર્થી હોસ્પિટલ ખાતે, સુરક્ષિત અને અસરકારક બીપીટી ની પૂર્તિ માટે અત્યાધ્યનક ઉપકરણોને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ.

જો કોઈ પણ જટિલતાઓ ઊભી થાય, તો તેના અસરકારક નિવારણ
માટે આપાતકાલિન દવાઓ હમેશા હાથવગી રાખવામાં આવે છે.



આરએમએસ પીસી-એક્ટન
(વૈકલ્પિક ઇન-બીલ્ટ ઇધજુ રેકોર્ડિંગ)



ફીલીપ્સ એમ્પી-પ
મલ્ટીપેરામિટર કાર્ડીયાક મોનિટર



બીપીએલ મોનોફેઝીક ડિફીલ્ટેર
અને સક્ષાન મશીન



એન્ડોટ્રેક્ટીયલ ઇન્ટ્યુનેશન કીટ
(લેરીંગ્સ્કોપ + એન્ડોટ્રેક્ટીયલ ટ્યુબ્સ)
અને આપાતકાલિન દવાઓ

બ્રીફ પલ્સ થેરાપી (બીપીટી)નું વિહંગાવલોકન

જ્યારે ઓપીડી પ્રોસીજર તરીકે આપવામાં આવે, ત્યારે દર્દીએ દાખલ થવાની જરૂર નથી અને બીપીટીના સમયે આવી શકે છે અને પ્રોસીજર બાદ થોડાક જ કલાકમાં જવા માટે મુક્ત છે.



બોયલ્સ એપેરેટ્સ

પ્રકાર

આઉટ-પેશાંટ (ઓપીડી) અને ઈન્ડોર-પેશાંટ (આઈપીડી) પ્રોસીજર.

પ્રોસીજરનો સમયગાળો

૧૫-૨૦ મિનીટ (સામાન્ય સમય)

મોં વાટે કશું નહિ લેવાનો સમયગાળો

૩-૪ કલાક
(ધન આહાર અને પ્રવાહીઓ)

જરૂરી બીપીટીની સંખ્યા

સામાન્ય કોર્સ ક બીપીટીનો છે.
૧૨ બીપીટી સુધીની જરૂરીયાત થઈ શકે છે

જળવણી માટેના બીપીટી

જરૂરી થઈ શકે છે

બીપીટી પૂર્વની કાર્યવાહી

પૂર્ણ જ્લક કાઉન્ટ (સી.બી.સી),
એસ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, એસ. કિએટીનીન, એસજીપીટી,
ઈસીજી એક્સ-રે, સીટી-સ્કેન / એમઆરઆઈ બેઇન
(જરૂર પડે, તો)



કાર્યપદ્ધતિને જાણો

- કાર્યપદ્ધતિ માટે દર્દી ભૂખ્યા પેટ આવે એ અપેક્ષિત છે. કાર્યપદ્ધતિ પહેલા ત-૪ કલાક સુધી પાણી સહિત, કોઈ પણ ઘન અથવા પ્રવાહી આહારનું સેવન કરવું ન જોઈએ.
- બીપીટીમાં ઉતેજન આપતા પહેલા, પ્રશિક્ષિત અનેસ્થેશીયોલોજિસ્ટ ડ્રારા ચોગ એનેસ્થેટિક માદયમ (આશરે ૧૦-૧૨ મિનીટની વિશિષ્ટ અસરકારકતાવાળા અલ્પ સમય માટે સાંક્ય માદયમ)નો ઉપયોગ કરીને દર્દનિ ચેતનાહીન કરવામાં આવે છે.
- એના અનુસરણમાં રનાયુ શિથિલકની માત્રા આપવામાં આવે છે, જે પૂર્ણ શરીરને શિથિલ કરે છે.
- ત્યાર બાદ વિદુતકીય ઉતેજન આપવામાં આવે છે. જે સામાન્ય રીતે ૧-૩ સેક્ઝ માટે આપવામાં આવે છે.
- ઉતેજન આપવાને લીધે એક ઉપચારક ખેંચ પ્રકટ થાય છે, જેના પર આ સમયગાળા દરમિયાન નિરીક્ષણ રાખવામાં આવે છે.
- કાર્યપદ્ધતિને અંતે, દર્દી એનેસ્થેશીયાની અસરમાંથી બહાર આવે છે અને ફરીથી સભાન થાય છે. દર્દી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે, ત્યાર બાદ તેને / તેણીને રજા આપવામાં આવે છે.
- પૂર્ણ કાર્યપદ્ધતિ દરમિયાન, દર્દીના હવાના માર્ગો અને હવાની અવરજનરની જાળવણી કરવામાં આવે છે અને મહત્વના લક્ષણો ઉપર સતત નિરીક્ષણ રાખવામાં આવે છે.

ઉપયોગમાં લેવાયેલ ઉપકરણો

- બીપીટી મશીન : આરએમએસ પીસી-એક્ટન બીફ પલ્સ થેરાપી મશીન
- મલ્ટી-પેરામીટર મોનીટર : ફીલીપ્સ એમ્પી-૫ મલ્ટી-પેરામીટર મોનીટર
- બોયલ્સ અપેરેટસ અને એનેસ્થેટિક ટ્રોલી
- બીપીએલ મોનોફેઝીક ડિફીલેટર

આડ અસરો

- બીપીટી સાથેની આડ અસરો એનેસ્થેશીયાને કારણે અથવા બીપીટી કાર્યપ્રક્રતિને કારણે હોઈશકે છે.
- કાર્યપ્રક્રતિ બાદ, બીપીટી સાથેની સૌથી સામાન્ય આડ અસરોમાં શરીરના દુઃ�ાવા, જડબાના દુઃખાવા, અને માથાના દુઃખાવાનો સમાવેશ છે. આ આડ અસરો અત્ય સમય માટે હોય છે અને પીડા શામકો (દા.ત. ડીક્લોફેનાક સોડીયમ) પ્રત્યે સારો પ્રતિસાદ આપે છે.
- બીપીટી સ્મૃતિલોપ અને મુંડવણાના સ્વરૂપમાં થોડા પ્રમાણમાં સ્મૃતિમાં ખલેલો પ્રેરી શકે છે. સામાન્ય રીતે આવું થોડાક કલાકો માટે બજી શકે છે. કેટલીક વાર દર્દીઓને ૨૧ દિવસો સુધી સ્મૃતિમાં ખલેલોનો અનુભવ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે આ સ્વ-સીમીત હોય છે અને તેના માટે કોઈ વધારાની દવાઓની જરૂર નથી પડતી.
- કોઈ એનેસ્થેશીયા સંબંધિત જટિલતાઓ જ્યુનતમ કરવા કરવા માટે બીપીટી પૂર્વ વિસ્તૃત ચકાસણી કરવામાં આવે છે.

ખોટી માન્યતાઓ	છીકતો
બીપીઠી જગૃત દર્દીનિ આપવામાં આવે છે	સંપૂર્ણ કાર્થ્યપદ્ધતિ દરમિયાન દર્દી એનેસ્ટેશીયા હેઠળ હોય છે. એનેસ્ટેશીયા આજ્ઞા બાદ બીપીઠી આપવામાં આવે છે.
લાંબા સમય માટે "ઇલેક્ટ્રીકલ શ્રોક" આપવામાં આવે છે.	વિશિષ્ટ મશીનનો ઉપયોગ કરીને નિયંત્રિત ઇલેક્ટ્રીકલ ઉતેજન આપવામાં આવે છે. ઉતેજનનો સરેરાશ સમયગાળો થોડીક સેકંડો (૧-૩ સેકંડ) માટે જ હોય છે.
બીપીઠી કાયમી સ્મૃતિલોપ કરે છે.	બીપીઠી સ્મૃતિના અથવા મગજની અન્ય કોઈ રચનાના કોઈ કાયમી નુકસાનથી સંલગ્ન નથી.
બીપીઠી રીસેટ કરે છે / મગજને ફેકટરી રીસેટ કરે છે.	મગજના રસાયાનિક સંતુલનમાં ફેરફારોની જટિલ શૃંખલા ઉત્પન્ન કરે છે, જે બિમારીમાંથી સાજા થવા તરફ લઈ જાય છે. કોઈ પણ પ્રકારે એ મગજની રચનાને બદલતું નથી.
બીપીઠી લીધા બાદ વ્યક્તિ ઉન્મત થઈ જાય છે.	બીપીઠી બિમારીનો ઈલાજ છે, બિમારી ઉત્પન્ન નથી કરતું.
દર્દી બીપીઠી ઉપર અવલંબિત થઈ જાય છે.	બીપીઠીના એક કોર્સ બાદ કોઈપણ પ્રકારનું અવલંબન ઉત્પન્ન નથી થતું.
ગંભીર માનસિક બિમારી માટે બીપીઠી આપવામાં આવે છે.	બિમારીની ગંભીરતાને દયાનમાં લીધા વિના, માનસિક બિમારીવાળા કોઈપણ દર્દિનિ બીપીઠી આપી શકાય છે.

વધારાનું વાંચન

વીડીયો

- <https://youtu.be/AcmarVpo2xE>
- <https://bit.ly/2ISImMC>
- <https://youtu.be/-T0mwzXHgvI>
- <https://vimeo.com/178622011>

પુસ્તકો / લેખો

- <https://mayocl.in/2EVIdU5>
- <https://bit.ly/2UJoAWs>
- <https://bit.ly/2GBG15X>
- <https://bit.ly/2ZvmIJT>
- <https://wb.md/2GAdX2e>

દર્દીઓ કહે છે

મારી પુત્રી ચાર-પાંચ વર્ષોથી ડીપ્રેશનથી પીડીત હતી. દવાઓની કોઈ વધુ અસર થઈ ન રહી હતી. પાર્થ હોસ્પિટલમાં ડૉ. પાર્થ અને ડૉ. પ્રિયલની સલાહ પ્રમાણો, અમે ઈ.સી.ટી. સારવાર કરાવી. ક ઈ.સી.ટી. બાદ મારી પુત્રીની બિમારી ઘણી ઓછી થઈ ગઈ અને પહેલી વાર, ઘણા વર્ષો બાદ અમે એના ચહેરા ઉપર સ્થિત જોયું. અમે ડૉ. પાર્થ અને ડૉ. પ્રિયલનો ખુબ આભાર માનીએ છીએ.

– એના પિતા
સુરેન્દ્રકુમાર, ઇન્ડાર”

મારી પટિને છેલ્લા ૧૦-૧૫ વર્ષથી ડીપ્રેશનથી પીડીત હતી. છ મહીના પહેલા અમે ડૉ. પાર્થ ગોચરલને મળ્યા, અમણે મારી પટિને ઈ.સી.ટી. આપવાનું સૂચન કર્યું. અમે તૈયાર નહોતા, પરંતુ ડૉ. પાર્થ અમને સમજાવ્યું કે, ઈ.સી.ટી. ઘણુંજ સુરક્ષિત છે. ઈ.સી.ટી. લિધા બાદ, ડૉ. પાર્થના સૂચન મુજબ તોણી ૬૦% સાજુ થઈ ગઈ.

મારી પટિને સાજુ કરવા માટે ડૉ. પ્રિયલે પણ સીટીંગ આપ્યા છે. ડૉ. પાર્થ અને ડૉ. પ્રિયલનો સ્વભાવ ઘણોજ સારો છે. તેઓ દર્દીની સમર્થનાને સમજે છે અને તેમને તેનાથી મુક્તિ અપાવવામાં સહાય કરે છે.

– શ્રી દિપેશ નંદા
પતિ, અમદાવાદ

ડૉ. પાર્થ ગોયલ

એમ.ડી. (સાયકીયાટ્રી)

કન્સલ્ટન્ટ સાઇકીયાટ્રીસ્ટ

પાર્થ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ

(મો.) ૮૮૭૭૨૫૫૧૬

drparthgoyal@gmail.com



- ડૉ. રાલ્ક હોક્મેનના માર્ગદર્શન હેઠળ, ચાલે રકૂલ ઓફ મેડિસિન, ડીપા. ઓફ સાયકીયાટ્રી, ચુ.એસ.એ. ખાતે (૨૦૧૪) રીસર્ચ એસોસીએટ તરીકે રીપીટીટીવ ટ્રાન્સકેનીયલ મેનેટીક સ્ટીમ્યુલેશન અને સારવાર રોધક સ્કીઓફેનીયામાં આડીટરી હાલુસીનેશન ઓછા કરવામાં એના રોલ ઉપર કાર્ય કર્યું.
- ડૉ. રાલ્ક હોક્મેનના માર્ગદર્શન હેઠળ, ચાલે રકૂલ ઓફ મેડિસિન ખાતે, અલ્ટ્રા-બીજ પલ્સ ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્ડીવ થેરાપી (ઇ.સી.ટી.)ના ઉપયોગમાં પ્રશાક્ષિત.
- ૨૦૮૮ સાટેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ નીમાનસ, બેંગલુરુ ખાતે ચોજાએલ જોન-ઇન્વેક્શિવ બેઈન સ્ટીમ્યુલેશન ઇન સાયકીયાટ્રી પર પહેલા સીપોસીયમાં “ટ્રાન્સ-કેનીયલ ડાયરેક્ટ કર્ટ સ્ટીમ્યુલેશન એઝ એ ટ્રીટમેન્ટ અંદરના ફોર હાલુસીનોસીસ” પર પોસ્ટર : એક્કેસ રીપોર્ટ પ્રસ્તુત કર્યો.
- ૪-૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮ દરમિયાન, ફલોરેન્સ, ઈટાલીમાં ૨૧૦૮ની અર્દ્વાર્ષિક મિટિંગ માટે “ ટ્રાન્સ-કેનીયલ ડાયરેક્ટ કર્ટ સ્ટીમ્યુલેશન ફોર સીવીયર, પર્સાસ્ટંટ, ટ્રીબેન્ટ રીફેક્ટરી આડીટરી હાલુસીનેશન્સ ઇન સ્કીઓફેનીયા” પર પોસ્ટર પ્રસ્તુત કર્યું.
- મેકટા કોપોરિશન ઢ્રારા, સિંગાપોર ખાતે, ડૉ. સાકેદીમ, ડૉ. જોર્જ, ડૉ. લૂ અને ડૉ. સીએનાએર્ડ ઢ્રારા સંચાલિત ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્ડીવ થેરાપી પર ઇન્ટરનેશનલ કોર્સમા હાજરી આપી.

ડૉ. પ્રિયલ ગોયલ

ડી.પી.એમ. (સાયકીયાટ્રી)

કન્સલ્ટન્ટ સાઇકીયાટ્રીસ્ટ

પાર્થ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ

(મો.) ૮૭૨૪૨૦૧૩૨

prids134@gmail.com



- મે ૨૦૧૭થી, પાર્થ ન્યુરોસાયકીયાટ્રીક હોસ્પિટલ ખાતે કન્સલ્ટન્ટ સાયકીયાટ્રીસ્ટ.
- નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરોસાયંસીસ (નીમાનસ), બેંગલુરુથી ન્યુરોસ્ટીમ્યુલેશન (ઇ.સી.ટી., આર.ટી.એમ.એસ., ટી.ડી.સી.એસ.)માં એક્સપર્ટ તરીકે સર્ટીફાઈડ.
- નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરોસાયંસીસ (નીમાનસ), બેંગલુરુથી કોર્નીટીવ બિહેવીયરલ થેરાપીમાં પ્રશાક્ષિત.
- ઇન્ટરેસ્ટમાં સમાવેશ છે, ન્યુરોસ્ટીમ્યુલેશન, પુનર હેલ્થ એન્ડ સાયકીયાટ્રી



પાર્થ હોસ્પિટલ

૩ જો માળ, સિંમા એક્સેલન્સ,
ફાલ્ગુની ગૃહ ઉદ્યોગ સામે, વસ્ત્રાપુર લેક પાસે,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨



એપોઇન્ટમેન્ટ માટે કોલ કરો

+૯૧ ૯૭૨૪૨ ૦૧૩૩૨ | +૯૧ ૭૯૪૦૧ ૮૧૨૪૧

+૯૧ ૯૮૭૬૭ ૨૫૫૧૯